

Roll No.-----

Paper Code		
6	0	7
(To be filled in the OMR Sheet)		

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सीरीज
Question Booklet Series

A

B.Com. (First Semester) Examination, February/March-2022

C010102T

Business Statistics

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही— सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक—पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : —

प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

- | | |
|---|---|
| 1. Who is the founder of Statistics ? | 1. सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है ? |
| (A) Lord kelvin | (A) लॉर्ड केविन |
| (B) Boddington | (B) बॉडिंगटन |
| (C) Got fried Achenwall | (C) गोट फ्राइड एकेनवाल |
| (D) Seligman | (D) सेलिंगमैन |
| 2. A sample survey is better because it is : | 2. एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें : |
| (A) More reliable | (A) अधिक विश्वसनीयता है |
| (B) Less time consuming | (B) समय की बचत होती है |
| (C) Less money consuming | (C) मुद्रा में बचत होती है |
| (D) All the above three | (D) उपर्युक्त तीनों |
| 3. Government Publication is : | 3. सरकारी प्रकाशन है : |
| (A) Primary data | (A) प्राथमिक समंक |
| (B) Secondary data | (B) द्वितीय समंक |
| (C) (A) and (B) both | (C) (A) व (B) दोनों |
| (D) None of these | (D) इनमें से कोई नहीं |
| 4. Mode can be computed from : | 4. बहुलक की गणना कर सकते हैं : |
| (A) Ogive | (A) ओजाइव से |
| (B) Frequency curve | (B) आवृत्ति वक्र से |
| (C) Histogram | (C) आवृत्ति आयत चित्र से |
| (D) None of these | (D) इनमें से कोई नहीं |
| 5. The arithmetic mean of the first N natural number 1,2,3.....N is : | 5. प्रथम N प्राकृतिक संख्याओं 1,2,3.....N का समान्तर माध्य होगा : |
| (A) $\frac{N+1}{2}$ | (A) $\frac{N+1}{2}$ |
| (B) $\frac{N}{2}$ | (B) $\frac{N}{2}$ |
| (C) $\frac{N(N+1)}{2}$ | (C) $\frac{N(N+1)}{2}$ |
| (D) None of these | (D) इनमें से कोई नहीं |

- | | |
|---|---|
| <p>6. Reciprocal of 0.0062:</p> <p>(A) .1613</p> <p>(B) 161.3</p> <p>(C) 1.613</p> <p>(D) 16.13</p> | <p>6. 0.0062 का व्युत्क्रम होगा :</p> <p>(A) .1613</p> <p>(B) 161.3</p> <p>(C) 1.613</p> <p>(D) 16.13</p> |
| <p>7. An Ideal index number is one that satisfies :</p> <p>(A) Factor reversal test</p> <p>(B) Time reversal test</p> <p>(C) Circular test</p> <p>(D) All above test</p> | <p>7. एक आदर्श निर्देशांक वह है जो पूर्ण करता है:</p> <p>(A) तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण</p> <p>(B) समय उत्क्रम्यता परीक्षण</p> <p>(C) चक्रीय परीक्षण</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी परीक्षण</p> |
| <p>8. Which of the following is not a function of statistics?</p> <p>(A) Economic Forecasting</p> <p>(B) Economic Equilibrium</p> <p>(C) Political Equilibrium</p> <p>(D) Construction of Economic models</p> | <p>8. निम्न में से कौन सांख्यिकी का कार्य नहीं है?</p> <p>(A) आर्थिक अनुमान</p> <p>(B) आर्थिक साम्य</p> <p>(C) राजनैतिक साम्य</p> <p>(D) आर्थिक मॉडल का विकास</p> |
| <p>9. The standard deviation for 15, 22, 27, 11, 9, 21, 14, 9 is :</p> <p>(A) 6.22</p> <p>(B) 6.12</p> <p>(C) 6.04</p> <p>(D) 6.32</p> | <p>9. 15, 22, 27, 11, 9, 21, 14, 9 के लिए प्रमाप विचलन है :</p> <p>(A) 6.22</p> <p>(B) 6.12</p> <p>(C) 6.04</p> <p>(D) 6.32</p> |

10. Spearman's Rank correlation coefficient P=

- (A) $\frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)}$
- (B) $1 + \frac{6\Sigma D^2}{N^3-N}$
- (C) $1 - \frac{\Sigma D^2}{N^3-N}$
- (D) $1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-N)}$

11. Which of the following is the non-random method of selecting samples from a population ?

- (A) Cluster sampling
- (B) Quota sampling
- (C) Multistage sampling
- (D) All of the above

12. First moment of dispersion is :

- (A) Quartile deviation
- (B) Standard deviation
- (C) Arithmetic mean
- (D) Mean deviation

13. Formula for family budget method is :

- (A) $\frac{\Sigma P_1 q_1}{\Sigma P_0 q_0} \times 100$
- (B) $\frac{\Sigma WPR}{\Sigma W} \times 100$
- (C) (A) & (B) both
- (D) None of these

10. स्पियरमैन का कोटि अन्तर सहसम्बन्ध गुणांक P=

- (A) $\frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)}$
- (B) $1 + \frac{6\Sigma D^2}{N^3-N}$
- (C) $1 - \frac{\Sigma D^2}{N^3-N}$
- (D) $1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-N)}$

11. निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श चुनने के लिए गैर यादृच्छिक विधि है ?

- (A) गुच्छ प्रतिचयन
- (B) कोटा प्रतिचयन
- (C) बहुस्तरीय प्रतिचयन
- (D) उपरोक्त सभी

12. प्रथम अपकिरण घात कहते हैं :

- (A) चतुर्थक विचलन
- (B) प्रमाप विचलन
- (C) समान्तर माध्य
- (D) माध्य विचलन

13. पारिवारिक बजट विधि का सूत्र है :

- (A) $\frac{\Sigma P_1 q_1}{\Sigma P_0 q_0} \times 100$
- (B) $\frac{\Sigma WPR}{\Sigma W} \times 100$
- (C) (A) व (B) दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

14. Range from the following data will be :
10, 12, 5, -6, -15, 4, -3
(A) 27
(B) 18
(C) 13
(D) None of these

15. Lorenz curve is used depict -
(A) Skewness
(B) Cumulative frequency distribution
(C) Dispersion
(D) Coefficient of correlation

16. Find the Geometric mean of 1, 3, 9, 3 :
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

17. If 18,374.65 is approximated up to one thousand, the approximated figure will be :
(A) 18,000
(B) 19,000
(C) 17,000
(D) 20,000

14. निम्न समकों से विस्तार होगा :
-10, 12, 5, -6, -15, 4, -3
(A) 27
(B) 18
(C) 13
(D) इनमें से कोई नहीं

15. लॉरेंज़ वक्र का प्रयोग होता है –
(A) विषमता
(B) संचयी आवृत्ति बंटन
(C) अपकिरण
(D) सह सम्बन्ध गुणांक

16. 1, 3, 9, 3 का गुणोत्तर माध्य निकालिए :
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

17. यदि 18,374.65 को हजार तक निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट किया जाए तो सन्निकट संख्या होगी:
(A) 18,000
(B) 19,000
(C) 17,000
(D) 20,000

18. Statistics is the study of :
 (A) Individual Unit
 (B) Aggregate
 (C) Both
 (D) None of these
19. The formula for coefficient is :
 (A) $C = \frac{Q}{N}$
 (B) $C = Q \times N$
 (C) $C = \frac{N}{Q}$
 (D) None of these
20. Which of the following is a three dimensional diagram ?
 (A) Sphere
 (B) Bar
 (C) Circle
 (D) Square
21. Find out mean mode and median of the given data:
 5, 8, 12, 17, 12, 14, 6, 8, 12, and 10
 (A) 11, 12, 10
 (B) 10, 12, 13
 (C) 11, 12, 13
 (D) 10, 12, 11
22. Statistics in German is called :
 (A) Statistik
 (B) Statista
 (C) Status
 (D) Statistique
18. सांख्यिकी अध्ययन है :
 (A) व्यक्तिगत इकाई
 (B) समूह
 (C) दोनों
 (D) इनमें से कोई नहीं
19. गुणांक का सूत्र है :
 (A) $C = \frac{Q}{N}$
 (B) $C = Q \times N$
 (C) $C = \frac{N}{Q}$
 (D) इनमें से कोई नहीं
20. निम्न में से कौन सा त्रि-विमीय चित्र है ?
 (A) गोला
 (B) दण्ड
 (C) वृत्त
 (D) वर्ग
21. दिए गए समकों 5, 8, 12, 17, 12, 14, 6, 8, 12 व 10 का माध्य, बहुलक एवं मध्यिका निकालिए:
 (A) 11, 12, 10
 (B) 10, 12, 13
 (C) 11, 12, 13
 (D) 10, 12, 11
22. सांख्यिकी को जर्मन में कहा जाता है :
 (A) स्टेटिस्टिक
 (B) स्टेटिस्टा
 (C) स्टेटस
 (D) स्टेटिस्टक्यू

- | | |
|---|--|
| <p>23. Data which an investigator may not be able to collect by himself:</p> <p>(A) Primary data</p> <p>(B) Secondary data</p> <p>(C) Primary and Secondary data</p> <p>(D) None of these</p> | <p>23. समंक जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं नहीं एकत्र कर पाता है:</p> <p>(A) प्राथमिक समंक</p> <p>(B) द्वितीयक समंक</p> <p>(C) प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>24. Mean of 15 numbers is 15. If two numbers 18 and 12 are removed then mean of remaining number will be :</p> <p>(A) 10</p> <p>(B) 12</p> <p>(C) 15</p> <p>(D) 25</p> | <p>24. 15 संख्याओं का माध्य 15 है। यदि दो संख्याओं 18 तथा 12 निकाल दी जाएं तब शेष संख्याओं का माध्य होगा :</p> <p>(A) 10</p> <p>(B) 12</p> <p>(C) 15</p> <p>(D) 25</p> |
| <p>25. Standard deviation is always :</p> <p>(A) Positive</p> <p>(B) Negative</p> <p>(C) Zero</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>25. प्रमाप विचलन सदैव होता है :</p> <p>(A) धनात्मक</p> <p>(B) ऋणात्मक</p> <p>(C) शून्य</p> <p>(D) उपर्युक्त में कोई नहीं</p> |
| <p>26. What will be skewness if median =24 and mean =26 ?</p> <p>(A) +2</p> <p>(B) -2</p> <p>(C) +6</p> <p>(D) -6</p> | <p>26. विषमता क्या होगी यदि मध्यिका =24 और माध्य =26 ?</p> <p>(A) +2</p> <p>(B) -2</p> <p>(C) +6</p> <p>(D) -6</p> |

27. Lagrange formula is useful :
- (A) For Extrapolation
 - (B) For Interpolation
 - (C) For unequal difference in the value of x
 - (D) All of above
28. Type of bar diagram is:
- (A) Pictogram
 - (B) Sub divided diagram
 - (C) Line diagram
 - (D) Pie diagram
29. On which assumption the method of least square is based ?
- (A) $\Sigma(y - y_c)^2 = \text{minimum}$
 - (B) $\Sigma(y - y_c) = \text{minimum}$
 - (C) $\Sigma(y - y_c)^2 = \text{Zero}$
 - (D) None of the above
30. Deflating of Index Number is necessary:
- (A) For the index no. of real wages
 - (B) For money income
 - (C) for real income
 - (D) None of the above

27. लैग्रेंज सूत्र उपयोगी है :
- (A) बाह्यगणन के लिए
 - (B) अन्तर्गणन के लिए
 - (C) x के मूल्यों में असमान अन्तराल के लिए
 - (D) उपर्युक्त सभी
28. दण्ड चित्र प्रकार है:
- (A) चित्रिय आलेख
 - (B) उप विभाजित आलेख
 - (C) रेखा आरेख
 - (D) पाई आरेख
29. न्यूनतम वर्ग रीति किस परिकल्पना पर आधारित है ?
- (A) $\Sigma(y - y_c)^2 = \text{न्यूनतम}$
 - (B) $\Sigma(y - y_c) = \text{न्यूनतम}$
 - (C) $\Sigma(y - y_c)^2 = \text{शून्य}$
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
30. निर्देशांको की अपस्फीति आवश्यक है :
- (A) वास्तविक मजदूरी के निर्देशांक हेतु
 - (B) मौद्रिक आय हेतु
 - (C) वास्तविक आय हेतु
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

31. Find the Median of given observations 5, 6, 11, 23, 4, 8, 20, 2 :
- (A) 1
(B) 7
(C) 8
(D) 9
32. Which of the following measures of dispersion is universally used ?
- (A) Quartile Deviation
(B) Mean Deviation
(C) Range
(D) Standard Deviation
33. Which of the following is a branch of Statistics ?
- (A) Descriptive Statistics
(B) Infernal Statistics
(C) Industry Statistics
(D) Both (A) & (B)
34. Which formula is used to calculate decile 7 (D_7) form the following ?
- (A) $D_7 = \frac{7(N+10)}{10}$
(B) $D_7 = \frac{N+1}{10}$
(C) $D_7 = \frac{N+1}{7}$
(D) None of the above
31. दिए गए अवलोकनों 5, 6, 11, 23, 4, 8, 20, 2 से मध्धिका ज्ञात करिए :
- (A) 1
(B) 7
(C) 8
(D) 9
32. अपकिरण के लिए किस माप का सार्वभौमिक प्रयोग किया जाता है ?
- (A) चतुर्थक विचलन
(B) माध्य विचलन
(C) विस्तार
(D) प्रमाप विचलन
33. निम्न में से कौन सांख्यिकी की शाखा है ?
- (A) वर्णात्मक सांख्यिकी
(B) अनुमानात्मक सांख्यिकी
(C) औद्योगिक सांख्यिकी
(D) (A) व (B) दोनों
34. निम्न में से कौन सा सूत्र सप्तम् दशक की गणना के लिए प्रयोग किया जाएगा ?
- (A) $D_7 = \frac{7(N+10)}{10}$
(B) $D_7 = \frac{N+1}{10}$
(C) $D_7 = \frac{N+1}{7}$
(D) उपर्युक्त में कोई नहीं

35. The square of standard deviation is known as :
- (A) Coefficient of correlation
(B) Modulus
(C) Variance
(D) Coefficient of variation
36. Reasons or causes for cyclical variations are :
- (A) Inflation
(B) Deflation
(C) Increase and Decrease in sales
(D) All of above
37. If mean =45, median =48 and coefficient of skewness = -0.4 then the value of standard deviation will be :
- (A) 20.5
(B) 25.9
(C) 15.9
(D) 22.5
38. Calculate Mode :
 $J=5, \bar{X}=40, SD=2$
- (A) 30
(B) 20
(C) 10
(D) None of these
35. प्रमाप विचलन का वर्ग कहलाता है :
- (A) सहसम्बन्ध गुणांक
(B) धनक
(C) प्रसरण
(D) विचरण गुणांक
36. चक्रीय उच्चावचन के कारण है :
- (A) मुद्रा प्रसार
(B) मुद्रा संकुचन
(C) विक्रय में वृद्धि एवं कमी
(D) उपरोक्त सभी
37. यदि माध्य =45, मधिका =48 तथा विषमता गुणांक = -0.4 है तो प्रमाप विचलन का मान होगा :
- (A) 20.5
(B) 25.9
(C) 15.9
(D) 22.5
38. बहुलक की गणना कीजिए :
 $J = 5, \bar{X} = 40, SD = 2$
- (A) 30
(B) 20
(C) 10
(D) इनमें से कोई नहीं

39. Which of the following relationship is correct ?
- (A) $AM = \sqrt{GM \times HM}$
 (B) $GM = \frac{AM+HM}{2}$
 (C) $HM = \sqrt{AM \times GM}$
 (D) $GM = \sqrt{AM \times HM}$
40. The classification method in which the upper limit of interval is same as of lower limit class interval is called :
- (A) Exclusive Method
 (B) Inclusive Method
 (C) Mid-Point Method
 (D) Ratio Method
41. Probable Error is :
- (A) $0.6753 \times SE$
 (B) $0.6754 \times SE$
 (C) $0.6457 \times SE$
 (D) $0.6745 \times SE$
42. The desired degree of accuracy is a statistical investigation depends on:
- (A) Available resources
 (B) Nature of Problem
 (C) Object and scope of investigation
 (D) All of these
39. निम्न में से कौन सा सम्बन्ध सही है ?
- (A) $AM = \sqrt{GM \times HM}$
 (B) $GM = \frac{AM+HM}{2}$
 (C) $HM = \sqrt{AM \times GM}$
 (D) $GM = \sqrt{AM \times HM}$
40. वर्गान्तर जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा बन जाती है, कहलाती है :
- (A) अपवर्जी रीति
 (B) समावेशी रीति
 (C) मध्य बिन्दु रीति
 (D) अनुपात रीति
41. सम्भाव्य विभ्रम होता है :
- (A) $0.6753 \times SE$
 (B) $0.6754 \times SE$
 (C) $0.6457 \times SE$
 (D) $0.6745 \times SE$
42. सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता की अपेक्षित मात्रा निम्न पर निर्भर करती हैं :
- (A) उपलब्ध साधन
 (B) समस्या की प्रकृति
 (C) अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र
 (D) इन सभी पर

43. Quartile divides series in how many parts ?
- (A) One
(B) Two
(C) Three
(D) Four
44. Index number is always expressed in :
- (A) Percentage
(B) Ratio
(C) Proportion
(D) None of the above
45. If the third and first quartile are 56.36 and 22.16 respectively then the quartile deviation is :
- (A) 78.52
(B) 17.1
(C) 34.2
(D) None of above
46. Histogram is used for the presentation of following type of series :
- (A) Continuous frequency distribution
(B) Time series
(C) Individual Observation
(D) Discrete frequency distribution
43. चतुर्थक श्रेणी को कितने भागों में बाँटता है ?
- (A) एक
(B) दो
(C) तीन
(D) चार
44. निर्देशांक सदैव दर्शाए जाते हैं :
- (A) प्रतिशत में
(B) अनुपात में
(C) समानुपात में
(D) उपर्युक्त में कोई नहीं
45. यदि तृतीय तथा प्रथम चतुर्थक क्रमशः 56.36 तथा 22.16 है तब चतुर्थक विचलन है :
- (A) 78.52
(B) 17.1
(C) 34.2
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
46. आवृत्ति आयत चित्र का निम्न प्रकार की श्रेणी के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है :
- (A) अविच्छिन्न आवृत्ति श्रेणी
(B) काल श्रेणी
(C) व्यक्तिगत अवलोकन
(D) खण्डित आवृत्ति श्रेणी

47. Find out first quartile from following data :
6, 9, 12, 8, 14, 13, 10, 8, 11
(A) 12
(B) 8
(C) 9
(D) 11
48. If $\Sigma xy = 140$, $\sigma_x = 5$, $\sigma_y = 4$, $N = 10$ then coefficient of correlation will be-
(A) +0.07
(B) -0.07
(C) -0.7
(D) +0.7
49. The mean of 20 items is 5 by mistake +6 is wirtten instead of -6, the correct mean will be :
(A) 5.2
(B) 4.4
(C) 4.2
(D) 4.0
50. Who has given the following definition of Index No.? "Index numbers are specialized type of average"
(A) Bowley
(B) Blair
(C) Boddington
(D) Secrite
47. निम्न समंको से प्रथम चतुर्थक को ज्ञात कीजिए :
6, 9, 12, 8, 14, 13, 10, 8, 11
(A) 12
(B) 8
(C) 9
(D) 11
48. यदि $\Sigma xy = 140$, $\sigma_x = 5$, $\sigma_y = 4$, $N = 10$ तो सहसम्बन्ध गुणांक होगा -
(A) +0.07
(B) -0.07
(C) -0.7
(D) +0.7
49. 20 मदों का औसत 5 है। त्रुटिवश एक पद का मूल्य -6 के स्थान पर +6 लिख गया, सही औसत होगा :
(A) 5.2
(B) 4.4
(C) 4.2
(D) 4.0
50. निर्देशांक की निम्न परिभाषा किसकी है ?
"निर्देशांक एक विशिष्ट प्रकार का माध्य है।"
(A) बाऊले
(B) ब्लेअर
(C) बौडीइन्गटन
(D) सेक्राइट

- | | |
|--|--|
| <p>51. The algebraic sum of the deviation from mean is :</p> <p>(A) Least</p> <p>(B) Maximum</p> <p>(C) Zero</p> <p>(D) None of these</p> | <p>51. माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग होता है :</p> <p>(A) न्यूनतम</p> <p>(B) अधिकतम</p> <p>(C) शून्य</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>52. Index number reveal the state of :</p> <p>(A) Deflation</p> <p>(B) Inflation</p> <p>(C) Neither (A) nor (B)</p> <p>(D) (A) and (B) both</p> | <p>52. सूचकांक निम्नलिखित की दिशा को प्रदर्शित करते हैं :</p> <p>(A) मूल्य ह्रास</p> <p>(B) मूल्य वृद्धि</p> <p>(C) न तो (A) और न ही (B)</p> <p>(D) (A) एवं (B) दोनों</p> |
| <p>53. What is the reason for distrust in statistics ?</p> <p>(A) Contradictory data</p> <p>(B) Use of data only by experts</p> <p>(C) Both (A) & (B)</p> <p>(D) None of these</p> | <p>53. सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का क्या कारण है?</p> <p>(A) परस्पर विरोधी आंकड़े होना</p> <p>(B) समंको का प्रयोग विशेषज्ञों द्वारा होना</p> <p>(C) (A) एवं (B) दोनों</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>54. Mode divides the series into two equal parts:</p> <p>(A) True</p> <p>(B) False</p> <p>(C) Not Possible</p> <p>(D) None of these</p> | <p>54. भूमिष्ठक समंक माला को दो बराबर भागों में विभाजित करता है:</p> <p>(A) सत्य</p> <p>(B) असत्य</p> <p>(C) असम्भव</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |

55. Charliers check is applied in :

- (A) Mode
- (B) Geometric mean
- (C) Arithmetic mean
- (D) Harmonic mean

56. Calculate Median form the following :

$$L_2=20, L_1=10, F=5, M-C=4$$

- (A) 18
- (B) 10
- (C) 30
- (D) None of these

57. The kelly's coefficient skewness is based on :

- (A) Decile
- (B) Quartile
- (C) Percentile
- (D) Quantile

58. Which of the following is not the kind of unbiased error ?

- (A) Accidental Error
- (B) Compensating Error
- (C) Random Error
- (D) Systematic Error

55. चार्लियर जाँच का प्रयोग होता है :

- (A) बहुलक में
- (B) गुणोत्तर माध्य में
- (C) समान्तर माध्य में
- (D) हरात्मक माध्य में

56. निम्नलिखित से मधिका की गणना कीजिए :

$$L_2=20, L_1=10, F=5, M-C=4$$

- (A) 18
- (B) 10
- (C) 30
- (D) इनमें से कोई नहीं

57. केली का विषमता गुणांक आधारित हैं :

- (A) दशमक
- (B) चतुर्थक
- (C) शतमक
- (D) पंचमक

58. निम्न में से कौन सा अनभिनत विभ्रम का प्रकार नहीं है ?

- (A) संयोजिक विभ्रम
- (B) क्षतिपूरक विभ्रम
- (C) दैव विभ्रम
- (D) व्यवस्थित विभ्रम

59. Cost of living at two different cities can be compared with the help of :
- (A) Value Index
(B) Consumer Price Index
(C) Volume Index
(D) Unweighted Index
60. Limitation of coefficient of skewness is :
- (A) +1
(B) -1
(C) +1 to -1
(D) All of above
61. If the actual age of a person is 50 years and estimated age is 45 year the relative error will be :
- (A) .011
(B) .11
(C) .05
(D) .09
62. Which one of the following is not a method of primary data collection
- (A) Interview
(B) Questionnaire
(C) Delphi method
(D) Documents
59. दो भिन्न शहरों में जीवन निर्वाह की तुलना की जाती है :
- (A) मूल्य निर्देशांक की सहायता से
(B) उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक की सहायता से
(C) वाल्यूम निर्देशांक की सहायता से
(D) अभारित निर्देशांक की सहायता से
60. विषमता गुणांक की सीमाएं हैं :
- (A) +1
(B) -1
(C) +1 से -1
(D) उपरोक्त सभी
61. यदि एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 50 वर्ष है और अनुमानित आयु 45 वर्ष है तो सापेक्ष विभ्रम होगा :
- (A) .011
(B) .11
(C) .05
(D) .09
62. निम्न में से कौन सी पद्धति प्राथमिक समंको के एकत्रीकरण की पद्धति नहीं हैं ?
- (A) साक्षात्कार
(B) प्रश्नावली
(C) डल्फी पद्धति
(D) प्रलेख

63. If the arithmetic mean of 7 observation is 100 and that of 3 observations is 50, the combined arithmetic mean would be :

- (A) 75
- (B) 65
- (C) 100
- (D) 85

64. Fisher's formula is :

- (A) $\sqrt{\frac{\Sigma P_1 q_0}{\Sigma P_0 q_1} \times \frac{\Sigma P_0 q_0}{\Sigma P_1 q_1}}$
- (B) $\sqrt{\frac{\Sigma P_1 q_0}{\Sigma P_0 q_0} \times \frac{\Sigma P_1 q_1}{\Sigma P_0 q_1}}$
- (C) $\sqrt{\frac{\Sigma P_0 q_0}{\Sigma P_1 q_0} \times \frac{\Sigma P_0 q_1}{\Sigma P_1 q_1}}$
- (D) None of above

65. Data for index number should be collected from :

- (A) The wholesale dealers
- (B) The selected group of persons
- (C) The retailers
- (D) None of these

66. The formula for standard error of correlation is :

- (A) $\frac{1+r^2}{\sqrt{n}}$
- (B) $\frac{1-r^2}{n}$
- (C) $\frac{1-r^2}{\sqrt{n}}$
- (D) $\frac{1+r^2}{n}$

63. यदि 7 अवलोकनों का समान्तर माध्य 100 है तथा 3 अवलोकनों का समान्तर माध्य 50 है तो दोनों का सामूहिक समान्तर माध्य होगा :

- (A) 75
- (B) 65
- (C) 100
- (D) 85

64. फिशर का सूत्र है :

- (A) $\sqrt{\frac{\Sigma P_1 q_0}{\Sigma P_0 q_1} \times \frac{\Sigma P_0 q_0}{\Sigma P_1 q_1}}$
- (B) $\sqrt{\frac{\Sigma P_1 q_0}{\Sigma P_0 q_0} \times \frac{\Sigma P_1 q_1}{\Sigma P_0 q_1}}$
- (C) $\sqrt{\frac{\Sigma P_0 q_0}{\Sigma P_1 q_0} \times \frac{\Sigma P_0 q_1}{\Sigma P_1 q_1}}$
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

65. सूचकांको के लिए समंको का संकलन करना चाहिए :

- (A) थोकमूल्य व्यापारियों से
- (B) चुनिंदा व्यक्तियों के समूह से
- (C) खुदरा व्यापारियों से
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

66. सह सम्बन्ध में प्रमाप विभ्रम का सूत्र है :

- (A) $\frac{1+r^2}{\sqrt{n}}$
- (B) $\frac{1-r^2}{n}$
- (C) $\frac{1-r^2}{\sqrt{n}}$
- (D) $\frac{1+r^2}{n}$

- | | |
|---|---|
| <p>67. Population census of the country is organised in how many difference of years ?</p> <p>(A) 10</p> <p>(B) 8</p> <p>(C) 12</p> <p>(D) 5</p> | <p>67. देश की जनगणना कितने वर्ष के अन्तर पर होती है ?</p> <p>(A) 10</p> <p>(B) 8</p> <p>(C) 12</p> <p>(D) 5</p> |
| <p>68. The index number which adopts base year quantity is a method of :</p> <p>(A) Laspeyre</p> <p>(B) Pasche</p> <p>(C) Bowley</p> <p>(D) Fisher</p> | <p>68. आधार वर्ष की मात्राओं से परिकलित निर्देशांक की रीति है :</p> <p>(A) लास्पेयर की</p> <p>(B) पाशे की</p> <p>(C) बॉउले की</p> <p>(D) फिशर की</p> |
| <p>69. Which method is not used to measure secular trend ?</p> <p>(A) Moving average method</p> <p>(B) Semi average method</p> <p>(C) Freehand curve method</p> <p>(D) Ratio to moving average method</p> | <p>69. दीर्घकालीन प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है ?</p> <p>(A) चलमाध्य रीति</p> <p>(B) अर्द्ध मध्यक रीति</p> <p>(C) मुक्त हस्तरेखा विधि</p> <p>(D) चल माध्य अनुपात रीति</p> |
| <p>70. The index number for the base year is always :</p> <p>(A) 100</p> <p>(B) 0</p> <p>(C) Any number</p> <p>(D) None of these</p> | <p>70. आधार वर्ष का सूचकांक सदैव :</p> <p>(A) 100 होता है</p> <p>(B) 0 होता है</p> <p>(C) कोई संख्या है</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |

71. The first step in tabulation is :

- (A) Foot note
- (B) Source note
- (C) Captions
- (D) Classification

72. By skewness we mean :

- (A) Lack of symmetry
- (B) Flatness of the distribution
- (C) Symmetry of the distribution
- (D) None of these

73. Coefficient of correlation is significant if :

- (A) $\frac{r}{P-E} > 3$
- (B) $\frac{r}{P.E} = 1$
- (C) $r > 0.075$
- (D) $\frac{r}{P.E} > 6$

74. Which of the following represents median ?

- (A) P_{50}
- (B) D_6
- (C) Q_1
- (D) None of these

71. सारणीयन में प्रथम चरण है :

- (A) पाद लेख
- (B) स्रोत लेख
- (C) अनुशीर्षक
- (D) वर्गीकरण

72. विषमता से हमारा तात्पर्य है :

- (A) सममित की कमी
- (B) बंटन का चपटापन
- (C) बंटन की सममित
- (D) इनमें से कोई नहीं

73. सह सम्बन्ध गुणांक की सार्थकता है, यदि

- (A) $\frac{r}{P-E} > 3$
- (B) $\frac{r}{P.E} = 1$
- (C) $r > 0.075$
- (D) $\frac{r}{P.E} > 6$

74. निम्न में से कौन सा मध्यिका को प्रदर्शित करता है ?

- (A) P_{50}
- (B) D_6
- (C) Q_1
- (D) इनमें से कोई नहीं

75. Statistics does not help business in:
- (A) Determining Place and Size
 - (B) Sales forecasting
 - (C) Production Planning
 - (D) Selection decision of Managing Director
76. The other name of Random Sampling is :
- (A) Chance sampling
 - (B) Probability sampling
 - (C) (A) and (B) both
 - (D) None of these
77. The median of the observation 11, 12, 14, 18, $x+4$, 30, 32, 35, 41 arranged in ascending order is 24, then x is :
- (A) 21
 - (B) 22
 - (C) 23
 - (D) 24
78. The concept of standard deviation was introduced by :
- (A) Bowley
 - (B) Karl Pearson
 - (C) Lorenz
 - (D) None of these
75. सांख्यिकी व्यवसाय की सहायता नहीं करती है :
- (A) स्थान एवं आकार निर्धारण में
 - (B) विक्रय पूर्वानुमान में
 - (C) उत्पादन नियोजन में
 - (D) प्रबन्ध संचालन की नियुक्ति निर्धारण में
76. दैव निदर्शन का अन्य नाम है :
- (A) अवसर निदर्शन
 - (B) सम्भावित निदर्शन
 - (C) (A) व (B) दोनों
 - (D) इनमें से कोई नहीं
77. आरोही क्रम में व्यवस्थित अवलोकन 11, 12, 14, 18, $x+4$, 30, 32, 35, 41 की मध्यिका 24 है, तो x है :
- (A) 21
 - (B) 22
 - (C) 23
 - (D) 24
78. प्रमाप विचलन के विचार का प्रतिपादन किया था :
- (A) बॉउले
 - (B) कार्ल पिर्यसन
 - (C) लॉरेन्ज
 - (D) इनमें से कोई नहीं

79. Which of the following mean is used to compare the average death rate of two cities ?
- (A) Geometric mean
(B) Weighted arithmetic mean
(C) Harmonic mean
(D) None of these
80. Coefficient of variation measures the :
- (A) Sample
(B) Performance
(C) Consistency
(D) Attitude
81. In a symmetrical distribution Q_1 and Q_2 are 30 and 45 respectively then the value of Q_3 is:
- (A) 60
(B) 45
(C) 75
(D) None of these
82. Statistical methods are used in the following fields :
- (A) Exact Science
(B) Socio-Economic fields
(C) Biology
(D) Every field of Science and knowledge
79. निम्न में से कौन सा माध्य दो शहरों की मृत्युदर की तुलना करने में प्रयोग किया जाता है ?
- (A) गुणोत्तर माध्य
(B) भारित समान्तर माध्य
(C) हरात्मक माध्य
(D) इनमें से कोई नहीं
80. विचरण गुणांक मापता है :
- (A) प्रतिदर्श
(B) निष्पादन
(C) संगति
(D) व्यवहार
81. एक सममित बंटन में Q_1 और Q_2 क्रमशः 30 और 45 हैं तो Q_3 का मान होगा :
- (A) 60
(B) 45
(C) 75
(D) इनमें से कोई नहीं
82. सांख्यिकीय विधियाँ निम्न क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं :
- (A) पूर्ण विज्ञान
(B) आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र
(C) जीव विज्ञान
(D) ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में

- | | |
|---|---|
| <p>83. Unit of analysis and interpretation is :
 (A) Ratio
 (B) Coefficient
 (C) Rates
 (D) All of these</p> <p>84. Which is not an essential element of sampling from following ?
 (A) Independency
 (B) Representative
 (C) Non-uniformity
 (D) Adequacy</p> <p>85. The average of 50 students in a class is 20 years. when the age of teacher is included the average age is increased by 1 year. the age of teacher is-
 (A) 55
 (B) 50
 (C) 71
 (D) 51</p> <p>86. Error is equal to :
 (A) Distance between the data point
 (B) Square of distance between the data point
 (C) Half the distance between the data point
 (D) None of these</p> | <p>83. विश्लेषण एवं निर्वचन की इकाई है :
 (A) अनुपात
 (B) गुणांक
 (C) दरें
 (D) यह सभी</p> <p>84. निम्न में से कौन सा निदर्शन का आवश्यक तत्व नहीं है ?
 (A) स्वतन्त्रता
 (B) प्रतिनिधित्व
 (C) असमानता
 (D) पर्याप्तता</p> <p>85. एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। उसमें अध्यापक की आयु जोड़ने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु है—
 (A) 55
 (B) 50
 (C) 71
 (D) 51</p> <p>86. विभ्रम बराबर है :
 (A) समंको के मध्य दूरी
 (B) समंको के मध्य दूरी का वर्ग
 (C) समंको के मध्य दूरी का आधा
 (D) इनमें से कोई नहीं</p> |
|---|---|

87. Squares are :
- (A) One dimensional diagram
 - (B) Two dimensional diagram
 - (C) Three dimensional diagram
 - (D) None of these

88. Under Newton's advancing difference method x is equal to-

- (A) $\frac{x_0 - x}{x_1 - x_0}$
- (B) $\frac{x_1 - x_0}{x_0 - x}$
- (C) $\frac{x - x_0}{x_0 - x_1}$
- (D) $\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$

89. The term statistics was first used in:

- (A) 1741
- (B) 1749
- (C) 1745
- (D) 1752

90. The difference between actual value and estimated value determines :

- (A) Relative Error
- (B) Absolute Error
- (C) Absolute and relative Error
- (D) None of these

91. Which data is cheaper to collect ?

- (A) Primary data
- (B) Secondary data
- (C) New data
- (D) Collective data

87. वर्ग हैं :

- (A) एक-विमीय चित्र
- (B) द्वि-विमीय चित्र
- (C) त्रि-विमीय चित्र
- (D) इनमें से कोई नहीं

88. न्यूटन की प्रगामी अन्तर विधि में $x =$

- (A) $\frac{x_0 - x}{x_1 - x_0}$
- (B) $\frac{x_1 - x_0}{x_0 - x}$
- (C) $\frac{x - x_0}{x_0 - x_1}$
- (D) $\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$

89. सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था :

- (A) 1741
- (B) 1749
- (C) 1745
- (D) 1752

90. वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य के अन्तर से ज्ञात होता है :

- (A) सापेक्ष विभ्रम
- (B) निरपेक्ष विभ्रम
- (C) निरपेक्ष और सापेक्ष विभ्रम
- (D) इनमें से कोई नहीं

91. कौन से समंक को एकत्र करना सस्ता है ?

- (A) प्राथमिक समंक
- (B) द्वितीयक समंक
- (C) नए समंक
- (D) सामूहिक समंक

92. Greater distance between the Lorenz curve and line of equal distribution shows :
- (A) Less in inequality
(B) More equality
(C) More in the inequality
(D) None
93. What is the formula for calculating simple mean using step deviation method?
- (A) $\bar{x} = A + \frac{\Sigma f dx}{N} \times i$
(B) $\bar{x} = \frac{\Sigma f dx}{N}$
(C) $\bar{x} = A + \frac{\Sigma f dx}{N}$
(D) None of these
94. Formula for Least Square Method is :
- (A) $y_c = a + bx$
(B) $y_c = a_x + b$
(C) $y_c = x + ab$
(D) $y_c = b + ax$
95. Which law is not based on sampling from the following ?
- (A) Law of inertia of large numbers
(B) Law of Probability
(C) Law of demand
(D) Law of statistical regularity
92. लॉरेन्ज वक्र एवं समान वितरण रेखा के मध्य अधिक दूरी दर्शाती है :
- (A) कम असमानता
(B) अधिक समानता
(C) अधिक असमानता
(D) कोई नहीं
93. पद विचलन रीति से समान्तर माध्य निकालने का सूत्र क्या है ?
- (A) $\bar{x} = A + \frac{\Sigma f dx}{N} \times i$
(B) $\bar{x} = \frac{\Sigma f dx}{N}$
(C) $\bar{x} = A + \frac{\Sigma f dx}{N}$
(D) इनमें से कोई नहीं
94. न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र है :
- (A) $y_c = a + bx$
(B) $y_c = a_x + b$
(C) $y_c = x + ab$
(D) $y_c = b + ax$
95. निम्नलिखित में से कौन सा नियम दैव प्रतिचयन पर आधारित नहीं है ?
- (A) महाँक जड़ता नियम
(B) सम्भावना नियम
(C) माँग का नियम
(D) सांख्यिकीय नियमितता नियम

96. Calculate the average mean of 4, 6, 8, 10, 15, 5
 (A) 4
 (B) 8
 (C) 6
 (D) None of these
97. The most suitable index number for the study of change in price level influencing a particular class of society :
 (A) Quantity index no.
 (B) Whole sale price index
 (C) Cost of living index no.
 (D) None of these
98. Problems of editing in time series-
 (A) Adjustment in calendar variations
 (B) Adjustment in value of price
 (C) Population changes adjustment
 (D) All of above
99. Fixed base index number and chain index number are :
 (A) The same
 (B) Different
 (C) Always 100
 (D) None of these
100. Statistics in terms of nature is :
 (A) A Science
 (B) An Art
 (C) Neither Science nor Art
 (D) Both Science and Art
96. औसत माध्य निकालिए :4, 6, 8, 10, 15,5
 (A) 4
 (B) 8
 (C) 6
 (D) इनमें से कोई नहीं
97. समाज के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले कीमत स्तर परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम निर्देशांक हैं :
 (A) मात्रा निर्देशांक
 (B) थोक विक्रम मूल्य निर्देशांक
 (C) जीवन निर्वाह निर्देशांक
 (D) इनमें से कोई नहीं
98. काल श्रेणी के सम्पादन की समस्याएँ :
 (A) कलैण्डर विचरण में समायोजन
 (B) मूल्य विचरण में समायोजन
 (C) जनसंख्या परिवर्तन समायोजन
 (D) उपरोक्त सभी
99. स्थिर आधार निर्देशांक तथा श्रृंखला निर्देशांक हैं :
 (A) समान
 (B) अलग-अलग
 (C) सदैव 100
 (D) इनमें से कोई नहीं
100. प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है :
 (A) एक विज्ञान
 (B) एक कला
 (C) न विज्ञान न कला
 (D) विज्ञान एवं कला दोनों

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.